

แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ที่สำคัญได้แก่ ตุ่มน้ำ บ่อคอนกรีตในห้องน้ำ แจกัน จานรองขาตู้ ภาชนะพรวน้ำ ฯลฯ

วิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์โดย :

- ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด




- ใส่ทรายอะเบท/ เกล็ดเอซาย-เอส เอส/ ปลากินลูกน้ำ/ จุลินทรีย์/ ตัวเนียง/ มวน



- เปลี่ยนน้ำในแจกันทุก 5 วัน
- ใส่ดินปลูกต้นไม้หรือปิดไม่ให้น้ำขังในยางรถยนต์
- ควรทำการฝังหรือเผาเศษขยะเพื่อไม่ให้มีน้ำขัง


ร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย





- กำจัดลูกน้ำยุงลายทุก 5 วันเป็นประจำ
- ป้องกันไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย
- ปรับปรุงบ้าน บริเวณบ้านให้สะอาด ปราศจากวัสดุเหลือใช้
- ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมสำรวจหรือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

วิธีการป้องกันยุงลายกัด และโรคไข้เลือดออก

- กางมุ้งทุกครั้งที่เข้านอน



- ใช้สารทาป้องกันยุง/ เครื่องไล่ยุงไฟฟ้า/ ยาจุดกันยุง/ ผ้าผสมสารลดการเกาะหรือป้องกันยุง



- ระวัง! อย่าให้ยุงกัดโดยเฉพาะในเวลากลางวัน โดยใช้ไม้ตียุงไฟฟ้าหรือใช้มือตบกำจัดยุง



- ฉีดพ่นสารกำจัดยุง

- ป้องกันไม่ให้มีลูกน้ำยุงลายทั้งภายในและนอกบ้าน



สนับสนุนการพิมพ์โดย



สูตรเข้มข้นพิเศษ

ผสมสารเคมีเฉพาะที่

ช่วยลดการเกาะของยุงได้ไม่น้อยกว่า 36%

*รับรองประสิทธิภาพการป้องกันยุงบนผ้าโดย
หน่วยวิจัยชีววิทยาและการควบคุมแมลงทางการแพทย์



หน่วยวิจัยวิทยาและการควบคุมแมลงทางการแพทย์
Research Unit for Biology and Control of Medical Insects

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก




จัดทำโดย
ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก

- เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน เพื่อจะได้รู้วิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และวิธีป้องกันไม่ให้ยุงกัด
- รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง




ยุงลายเป็นพาหะไข้เลือดออกได้อย่างไร



วงจรชีวิต ประมาณ 9-14 วัน
เมื่อยุงไปกัดผู้ที่มีเชื้อไวรัสไข้เลือดออก
จะกลายเป็นยุงพาหะ แพร่เชื้อได้ตลอดชีวิต

เมื่อไรควรไปพบแพทย์

1. มีไข้สูงกระทันหัน อาเจียน
 - รับประทานอาหารไม่ได้ ตับโต
 - เจ็บหน้าอกอาจจะมีเลือดกำเดาออก
2. รับประทานยาลดไข้ แล้วไข้ไม่ลด
อ่อนเพลียมาก



โรคไข้เลือดออก



- เป็นโรคติดต่ออันตราย มียุงลายเป็นตัวนำเชื้อไวรัส
- เกิดในทุกเพศ ทุกวัย ส่วนใหญ่พบในเด็ก
- พบทุกพื้นที่ในประเทศไทย ระบาดมากในฤดูฝน
- รักษาไม่ทันอาจเสียชีวิต
- สามารถป้องกันโรคนี้ได้โดยการกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์

โรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นได้อย่างไร



- เกิดหลังจากถูกยุงลายที่มีเชื้อไวรัสกัด 1 สัปดาห์ และผู้ที่ถูกกัดขาดภูมิคุ้มกันโรค
- ขณะนี้ยังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสไข้เลือดออก แพทย์จะให้การรักษาตามอาการ

การดูแลรักษาเบื้องต้น



- เมื่อไข้สูงให้เช็ดตัว
- ให้อาลดไข้
- พาราเซตามอล
- ห้ามใช้ยาแอสไพริน



- ให้ดื่มนม/ ผงเกลือแร่/ น้ำผลไม้ แก้อ่อนเพลีย

- อาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน รีบไปโรงพยาบาล โดยด่วน เพราะการรักษาที่ถูกต้อง จะป้องกันการช็อกและเสียชีวิตจากโรคนี้

