

แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ที่สำคัญได้แก่ ตุ่มน้ำ บ่อคูนกรีดในห้องน้ำ
แจกลับ จานรองขาตู้ กระถางพืชฯลฯ
วิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์โดย :

- ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด
- ใช้ทรายอะเบท/ เกล็ดเขซาย-เอส/ ปลา金ลูกน้ำ/ จุลินทรีย์/ ตัวหนอนยุง/ น้ำยา^{MA/MAY} - ไลฟ์การ์ด/ เกล็ดเขซาย-เอส/ ปลา金ลูกน้ำ/ จุลินทรีย์/ ตัวหนอนยุง/ น้ำ
- เปลี่ยนน้ำในแจกลับทุก 5 วัน
- ใช้เดินปูกดดันน้ำให้อบปิดไม่ให้น้ำขังในย่างรดยันต์
- ควรทำการฝังหรือเพาเดย์ของเพื่อไม่ให้มีน้ำขัง


ร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย




- กำจัดลูกน้ำยุงลายทุก 5 วันเป็นประจำ
- ป้องกันไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย
- ปรับปรุงบ้าน บริเวณบ้านให้สะอาด ปราศจากวัสดุ เหลือใช้
- ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมสำรวจ
หรือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

วิธีการป้องกันยุงลายกัด และโรคไข้เลือดออก

- การมีสุขทุกครั้งที่เที่ยวอน



- ใช้สารทากป้องกันยุง/ เครื่องไล่ยุง
ไฟฟ้า/ ยาจุดกันยุง/ ผ้าผสานสาร
ลดการเกาะหรือป้องกันยุง



- ระวัง! อย่าให้ยุงกัดโดยเฉพาะ
ในเวลากลางวัน โดยให้มีตี-
ยุงไฟฟ้าหรือใช้
มือตอบกำจัดยุง



- ฉีดพ่นสารกำจัดยุง



- ป้องกันไม่ให้มีลูกน้ำยุงลาย
ทั้งภายในและนอกบ้าน



สนับสนุนการพิมพ์โดย



ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้า Downy
ท่านจะช่วยลดการติดเชื้อโรคได้มากกว่า 36%



สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
มหาวิทยาลัยมาหิดล
Research Unit for Malaria and Other Vector-Borne Diseases
Mahidol University

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ โรคไข้เลือดออก



จังหวัด
ฝ่ายรัฐวิทยาและนิเวศวิทยา^{จังหวัด}
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก

- เพียงพอร์ความรู้แก่ประชาชน เพื่อจะได้รู้ถึงการจัด
แหล่งเพาะพันธุ์และวิธีป้องกันไม่ให้บุญกัด
- รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง



ยุงลายเป็นพาหะไข้เลือดออกได้อย่างไร



วงจรชีวิต ประมาณ 9-14 วัน
เมื่อยุงไปกัดผู้ที่มีเชื้อไวรัสไข้เลือดออก
จะถ่ายเป็นยุงพาหะ พร้อมกับได้ติดเชื้อไวรัส

โรคไข้เลือดออก



- เป็นโรคติดต่ออันตราย มีสูงลายเป็นตัวนำเชื้อไวรัส
- เกิดในทุกเพศ ทุกวัย ส่วนใหญ่พบในเด็ก
- พบทุกพื้นที่ในประเทศไทย ระบาดมากในฤดูฝน
- รักษาไม่ทันอาจเสียชีวิต
- สามารถป้องกันโรคนี้ได้โดยการกำจัดลูกน้ำสูงลาย
และแหล่งเพาะพันธุ์

โรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นได้อย่างไร



- เกิดหลังจากสูงลายที่มีเชื้อไวรัสกัด 1 สัปดาห์
และผู้ที่ถูกกัดขาดความดันหัวกันใจ
- ขณะนี้ยังไม่มียาน่าเข้าอีกไวรัสไข้เลือดออก แพทย์จะ
ให้การรักษาตามอาการ

เมื่อโรคไข้เลือดออก

1. มีไข้สูงร้าวหันหัน อาเจียน
 - รับประทานอาหารไม่ได้ ตับโต
เจ็บหน้าอกอาจจะมีเลือดกำเดาออก
2. รับประทานยาลดไข้ แล้วไข้ไม่ลด
อ่อนเพลียมาก



การดูแลรักษาเบื้องต้น

- เมื่อไข้สูงให้เข็มดัว
- ให้ยาลดไข้ พาราเซตามอล
ห้ามใช้ยาแอสไพริน
- ให้ดื่มน้ำ/ ผงเกลือแร่/
น้ำผลไม้ แก้อ่อนเพลีย
- อาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน รีบไปโรงพยาบาล
โดยด่วน เพื่อการรักษาที่ถูกต้อง
จะป้องกันการ死胡同และเสียชีวิต
จากโรคนี้